

MUERTE DE NIÑA POR DIFTERIA EN BÉLGICA



NO ESTABA VACUNADA

En Amberes, Bélgica una niña de 3 años falleció de Difteria.(17-3-2016)

La niña se enfermó, pero la dificultad en hacer el diagnóstico, hizo que empeorara, ya que en Europa como España, la Difteria es muy rara y la mayoría de los pediatras que trabajan en esta época no han visto nunca un caso de Difteria. Esto provocó que en este caso como en el de España el año pasado, se tardara en hacer el diagnóstico y la enfermedad progresara.

LA ANTITOXINA NO LLEGÓ A TIEMPO

Parece inexplicable, pero sucedió lo mismo que en España. Al tratarse de una enfermedad prácticamente erradicada, que no se ve en países desarrollados y por la que las personas ya no mueren, no hay disponibilidad directa de la antitoxina .

Se perdió mucho tiempo buscando la antitoxina y la niña no pudo superarlo.

Lo cuestionable es que si se tenía la experiencia del caso similar ocurrido en España el año pasado (donde hacía décadas que no había un caso y no se disponía de antitoxina), no se tomaran las medidas para que hubiera existencias de la antitoxina en los otros países.

En Bélgica, casi todos los niños están siendo vacunados, pero si alguien contrae la enfermedad, el tratamiento es doble: antibióticos para destruir la bacteria y la antitoxina para acabar con la

toxina diftérica. Esta última debe ser administrada tan pronto como sea posible en los casos graves y aquí es donde la respuesta falló, además del diagnóstico tardío.

El ECDC(Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades)emitió un comunicado, días después del fallecimiento de la niña para confirmar que “la inmunización universal con la vacuna que contenga toxoide diftérico es la única medida preventiva eficaz para el control de la Difteria”.

Además, ante la dificultad de conseguir la antitoxina en los países europeos y para evitar que casos que podrían controlarse acaben como estos 2 niños que fallecieron(España y Bélgica),se sugiere:

- Actualizar los conocimientos en los médicos ,para reconocer y tratar precozmente los casos de Difteria.
- Garantizar que los laboratorios tengan la capacidad de hacer las pruebas necesarias para confirmar las infecciones por toxina diftérica.
- Evaluar el nivel de acceso a la antitoxina diftérica y considerar opciones de disponibilidad entre naciones para asegurar el rápido acceso a ella.
- Aconsejar a los que viajan a los países donde la Difteria es endémica,que comprueben si necesitan vacunarse contra la enfermedad.
- Promover y supervisar el acceso a la inmunización en niños y adultos.

Dra. Manuela Soto

13-05-2016